


NCGM COVID-19 入院治療フローチャート (成人)

2021年8月30日 第4版作成



* 10,000 単位/日で投与開始。APTT は延長させなくてもいい。基本は経静脈投与だが酸素量 5L/分未満なら皮下注でも可。

| 薬剤名 | 投与量 | 投与期間 | 使用注意 | その他 |
|---------------------|--|-----------------------|---|---|
| レムデシビル (ベクルリー®) | 初回 200mg 1日1回 翌日以降 100mg 1日1回 | 5~10日間 | ① eGFR<30mL/min ② ALTが正常上限の5倍以上 | 5日間で臨床症状の改善を認めなければ10日間まで投与延長可 |
| デキサメタゾン | 経口・経管 デカドロン錠®4mg 1.5錠 1日1回 経静脈 デキサート注射液®6.6mg 1筒 1日1回 | 7~10日間（酸素需要が消失したら終了可） | ① 活動性消化管出血 ② 本薬剤にアレルギーあり | 40kg未満では0.15mg/kg/日に減量。妊婦・授乳婦にはプレドニゾロン40mg/日で代用。高体重に高用量メチルプレドニゾロン(1-2mg/kg/day)、重症例にパルス療法も行われている。 |
| トシリズマブ (アクテムラ®) | 8mg/kg (上限800mg)を静注 1日1回 適応外使用につき各施設内で手続きが必要である | 1日間 | ① 活動性肺結核の可能性ある ② ALTが正常上限の5倍以上 | 投与前に結核、非結核性抗酸菌症、B型肝炎のスクリーニングを実施（胸部画像検査、QFT/T-SPOT、HBs抗原・HBs抗体・HBc抗体） |
| バリシチニブ (オルミエント®) | 4mgを1日1回内服 30≤eGFR<60の場合は2mgに減量 | 最大14日間 | ③ 好中球数<500/mm ³ ④ リンパ球数<500/mm ³ ⑤ 血小板数<5万/mm ³ | |
| カシリズマブ/ イムデビマブ | ロナプリーブ® 1200mgを単回投与（成人および体重40kg以上の小児に限る） | 1日間 | 本剤にアレルギーあり | 発症から8日目以降のCOVID-19患者に対する有効性は確立していない |